

$$u_1 \in]0, \pi[\text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin(u_n)$$

(17) $0 < u_1 < \pi \Rightarrow 0 < \sin(u_1) < 1$
 $\Rightarrow u_2 = \left(1 + \frac{1}{1}\right) \sin(u_1) = 2 \sin(u_1) \in]0, 2[\subset]0, \pi[$

$$u_3 = \frac{3}{2} \sin(u_2) \in]0, \frac{3}{2}[\subset]0, \pi/2[\quad (\text{car } \sin(u_2) \in]0, 1])$$

Raisonnons maintenant par récurrence:

(i) $u_3 \in]0, \pi/2[$

(ii) on suppose $u_n \in]0, \pi/2[$ (pour n fixé ($n \geq 3$))

(iii) $u_{n+1} = \frac{n+1}{n} \sin(u_n)$ avec $0 < \sin(u_n) < 1$
 $\Rightarrow 0 < u_{n+1} < \frac{n+1}{n}$

or $n \geq 3$ donc $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{3}$ et $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{4}{3} < \frac{\pi}{2}$

D'où $0 < u_{n+1} < \pi/2$

car $8 < 3 \cdot \pi$

Conclusion: $\forall n \geq 3, u_n \in]0, \pi/2[$

(18) Soit $l \in \mathbb{R} / \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$.

La fonction sinus étant continue sur \mathbb{R} , on a par passage à la limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = l = \sin(l) \Leftrightarrow l = 0 \quad (\text{on pourra vérifier que } x \mapsto \sin(x) - x \text{ est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur } \mathbb{R} \text{ car continue et strictement décroissante, et qui annule l'unité de } \mathbb{R})$$

Conclusion le seul réel vers lequel (u_n) peut converger est 0

(19) On peut se contenter d'écrire:

```
def calculU (u1: float, n: int) -> list:
    L = [u1]
    for k in range (1, n):
        u_k = (1 + 1/k) * sin(L[-1])
        L.append (u_k)
    return L
```





≠ on aura
 $L = [u_1, \dots, u_n]$

Pour la représentation graphique :

```

a = 0.3
n = 100
I = np.arange(1, n+1)
plt.plot(I, uvals(a, n), 'ro')
    
```

ce qui donne :



Conjecture : Pour tout $a_1 \in]0; \pi[$ la suite (u_n) décroît à partir d'un certain rang.

(20) Hypothèse : on suppose qu'il existe $n_0 \geq 1$ tel que
 $u_{n_0} \leq u_{n_0-1}$
 Montrons que (u_n) décroît à partir du rang n_0 :
 Par sa monotonie par récurrence que :
 $\forall n \geq n_0, u_n \leq u_{n-1}$

(i) $u_{n_0} \leq u_{n_0-1}$ par hypothèse.
 (ii) à prouver que $u_n \leq u_{n-1}$ pour n fixé ($n \geq n_0$)

$$(iii) \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin(u_n)}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right) \sin(u_{n-1})} = \underbrace{\frac{n+1}{n} \cdot \frac{n-1}{n}}_{= \frac{n^2-1}{n^2}} \frac{\sin(u_n)}{\sin(u_{n-1})}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \frac{\sin(u_n)}{\sin(u_{n-1})}$$

or, par hypothèse de récurrence et d'après (1):

$$0 < u_n \leq u_{n-1} < \pi/2 \quad (\text{car } n \geq 4 \Rightarrow n-1 \geq 3)$$

donc

$$0 < \sin(u_n) \leq \sin(u_{n-1}) < 1 \quad (\text{car } t \mapsto \sin(t) \text{ est strictement } \uparrow \text{ sur } [0, \pi/2])$$

$$\text{Soit } 0 < \frac{\sin(u_n)}{\sin(u_{n-1})} < 1$$

et comme par ailleurs $0 < 1 - \frac{1}{n^2} < 1 \quad \forall n \geq 4$,
on a:

$$0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1 \quad \text{ou encore } u_{n+1} < u_n \quad (\text{car } u_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N})$$

Conclusion Si $\exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 \geq 4 / u_{n_0} \leq u_{n_0-1}$, alors
 $u_n \leq u_{n-1} \quad \forall n \geq n_0$, et encore:
 (u_n) décroît à partir du rang n_0

(21) Raisonnons par l'absurde: si pour tout entier $n \geq 4$
on a $u_n > u_{n-1}$, cela signifie que $(u_n)_{n \geq 4}$ est
croissante

Comme par ailleurs, d'après (1): $0 < u_n < \frac{\pi}{4} \quad \forall n \geq 3$,

la suite $(u_n)_{n \geq 4}$ est croissante et majorée. Elle
converge d'après le thém. de la limite monotone,
vers $l > u_3 > 0$.

Absurde car d'après (2) la seule limite possible
est $l = 0$.

Conclusion: $\exists n_0 \geq 4 / u_{n_0} \leq u_{n_0-1}$

(22) D'après (4) et (5): $\exists n_0 \geq 4 / (u_n)_{n \geq n_0}$ décroît.
Elle est minorée par 0 donc elle converge vers
la seule limite possible, à savoir $l = 0$.

Conclusion (u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

(23) On utilise le programme Python:

$$L_1 = \text{calcul}(u_1, n)$$

$$L_k = [\text{sqrt}(k+1) * L_1[k]] \text{ for } k \text{ in range}(n)$$

Quelle que soit la valeur de u_1 prise dans $]0, \pi[$, la valeur de $L_1[-1]$ est proche de 3 pour de grandes valeurs de n .

Conjecture: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot u_n = 3$

24) $\forall n \geq 1$, on pose $x_n = \frac{u_n}{n}$.

$$x_{n+1} - x_n = \frac{u_{n+1}}{n+1} - \frac{u_n}{n} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} \sin(u_n) - \frac{u_n}{n}$$

$$= \frac{1}{n} [\sin(u_n) - u_n]$$

Pour rappel, $\sin a = a - \frac{a^3}{6} + o(a^3)$ et donc

$$\sin a - a \sim -\frac{a^3}{6}$$

Dès lors, puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, on a:

$$x_{n+1} - x_n \sim -\frac{u_n^3}{6n} = -\frac{n^3 x_n^3}{6n} = -\frac{n^2}{6} x_n^3$$

$$\text{Ensuite, } \frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} = \frac{x_n^2 - x_{n+1}^2}{x_n^2 x_{n+1}^2} = \frac{(x_n - x_{n+1})(x_n + x_{n+1})}{(x_n x_{n+1})^2}$$

avec $x_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} \sin(u_n) \sim \frac{u_n}{n} = x_n \Rightarrow x_n x_{n+1} \sim x_n^2$

et $x_n + x_{n+1} = \frac{u_n}{n} + \frac{1}{n+1} \sin(u_n) = \frac{u_n}{n} \left[1 + \frac{\sin(u_n)}{u_n} \right] \sim 2 \frac{u_n}{n} = 2x_n$

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$

En conséquence:

$$\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} \sim \frac{n^2}{6} \cdot \frac{2x_n}{x_n^4} = \frac{n^2}{3}$$

Conclusion $x_{n+1} - x_n \sim -\frac{n^2}{6} x_n^3$; $\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} \sim \frac{n^2}{3}$

25) On admet: $\frac{1}{x_n^2} \sim \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{3}$; $n u_n^2 = n(n^2 x_n^2) = n^3 x_n^2$

$$\text{D'où } \frac{1}{n u_n^2} = \frac{1}{n^3 x_n^2} \sim \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{3} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{(k/n)^2}{3} \sim \int_0^1 \frac{t^2}{3} dt$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n u_n^2} = \left[\frac{t^3}{9} \right]_0^1 = \frac{1}{9}; \text{ conclusion } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot u_n = 3$$

↳ Somme de Riemann.