

# Echauffements

30 août 2024

# Fiches d'échauffement

- 1 Logique et sommes usuelles
- 2 Nombres complexes et trigonométrie
- 3 Polynômes

# Table des matières

- 1 Logique et sommes usuelles
- 2 Nombres complexes et trigonométrie
- 3 Polynômes

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y :$
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  :
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  :
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :  $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  :
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :  $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$  ; **FAUX**.  
non( $P_3$ ) :
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  :
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$



# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :  $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$  ; **FAUX**.  
non( $P_3$ ) :  $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / p \leq n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  :
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :  $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$  ; **FAUX**.  
non( $P_3$ ) :  $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / p \leq n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  ; ; **FAUX**.  
non( $P_4$ ) :
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :  $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$  ; **FAUX**.  
non( $P_3$ ) :  $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / p \leq n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  ; ; **FAUX**.  
non( $P_4$ ) :  $\exists f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} / \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :  $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$  ; **FAUX**.  
non( $P_3$ ) :  $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / p \leq n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  ; ; **FAUX**.  
non( $P_4$ ) :  $\exists f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} / \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$  ;  
**FAUX**.  
non( $P_5$ ) :

# Négations

Les propositions suivantes sont elles vraies ? dans le cas contraire, énoncer leur négation :

- $(P_1) : \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > 5$  ; **VRAI**
- $(P_2) : \forall n \in \mathbb{N}, n^2 > 5$  ; **FAUX**.  
non( $P_2$ ) :  $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 5$
- $(P_3) : \exists p \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, p > n^2$  ; **FAUX**.  
non( $P_3$ ) :  $\forall p \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / p \leq n^2$
- $(P_4) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists y \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq y$  ; ; **FAUX**.  
non( $P_4$ ) :  $\exists f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} / \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$
- $(P_5) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$  ;  
**FAUX**.  
non( $P_5$ ) :  $\exists f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} / \exists (x, x') \in \mathbb{R}^2, x \neq x' \text{ et } f(x) = f(x')$

## Ordre des quantificateurs

Soit  $E = \{\text{exercices du T.D.1}\}$  et  $B = \{\text{étudiants de BCPST2}\}$ .  
On considère la relation notée  $P(x, y)$  qui désigne :  $x$  est résolu par  $y$ .

Soit les  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  les propositions suivantes :

- $A : \forall x \in E, \exists y \in B / P(x, y)$ .
- $B : \exists y \in B / \forall x \in E, P(x, y)$ .
- $C : \exists x \in E / \forall y \in B, P(x, y)$ .
- $D : \forall y \in B, \exists x \in E / P(x, y)$ .

Indiquez les propositions qui sont toujours vraies :

$A \Rightarrow B$  ?

$B \Rightarrow A$  ?

$C \Rightarrow D$  ?

$D \Rightarrow C$  ?

## Ordre des quantificateurs

Soit  $E = \{\text{exercices du T.D.1}\}$  et  $B = \{\text{étudiants de BCPST2}\}$ .  
On considère la relation notée  $P(x, y)$  qui désigne :  $x$  est résolu par  $y$ .

Soit les  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  les propositions suivantes :

- $A : \forall x \in E, \exists y \in B / P(x, y)$ .
- $B : \exists y \in B / \forall x \in E, P(x, y)$ .
- $C : \exists x \in E / \forall y \in B, P(x, y)$ .
- $D : \forall y \in B, \exists x \in E / P(x, y)$ .

Indiquez les propositions qui sont toujours vraies :

$A \Rightarrow B$  ? **Faux**

$B \Rightarrow A$  ?

$C \Rightarrow D$  ?

$D \Rightarrow C$  ?

## Ordre des quantificateurs

Soit  $E = \{\text{exercices du T.D.1}\}$  et  $B = \{\text{étudiants de BCPST2}\}$ .  
On considère la relation notée  $P(x, y)$  qui désigne :  $x$  est résolu par  $y$ .

Soit les  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  les propositions suivantes :

- $A : \forall x \in E, \exists y \in B / P(x, y)$ .
- $B : \exists y \in B / \forall x \in E, P(x, y)$ .
- $C : \exists x \in E / \forall y \in B, P(x, y)$ .
- $D : \forall y \in B, \exists x \in E / P(x, y)$ .

Indiquez les propositions qui sont toujours vraies :

$A \Rightarrow B$  ? **Faux**

$B \Rightarrow A$  ? **Vrai**

$C \Rightarrow D$  ?

$D \Rightarrow C$  ?



## Ordre des quantificateurs

Soit  $E = \{\text{exercices du T.D.1}\}$  et  $B = \{\text{étudiants de BCPST2}\}$ .  
On considère la relation notée  $P(x, y)$  qui désigne :  $x$  est résolu par  $y$ .

Soit les  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  les propositions suivantes :

- $A : \forall x \in E, \exists y \in B / P(x, y)$ .
- $B : \exists y \in B / \forall x \in E, P(x, y)$ .
- $C : \exists x \in E / \forall y \in B, P(x, y)$ .
- $D : \forall y \in B, \exists x \in E / P(x, y)$ .

Indiquez les propositions qui sont toujours vraies :

$A \Rightarrow B$  ? **Faux**

$B \Rightarrow A$  ? **Vrai**

$C \Rightarrow D$  ? **Vrai**

$D \Rightarrow C$  ?

## Ordre des quantificateurs

Soit  $E = \{\text{exercices du T.D.1}\}$  et  $B = \{\text{étudiants de BCPST2}\}$ .  
On considère la relation notée  $P(x, y)$  qui désigne :  $x$  est résolu par  $y$ .

Soit les  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  les propositions suivantes :

- $A : \forall x \in E, \exists y \in B / P(x, y)$ .
- $B : \exists y \in B / \forall x \in E, P(x, y)$ .
- $C : \exists x \in E / \forall y \in B, P(x, y)$ .
- $D : \forall y \in B, \exists x \in E / P(x, y)$ .

Indiquez les propositions qui sont toujours vraies :

$A \Rightarrow B$  ? **Faux**

$B \Rightarrow A$  ? **Vrai**

$C \Rightarrow D$  ? **Vrai**

$D \Rightarrow C$  ? **Faux**

# Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :
  - Sa contraposée est :
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$  ?
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - On a  $P$  si on a  $Q$  ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$  ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : \_\_\_\_\_ et «  $P$  seulement si  $Q$  » : \_\_\_\_\_
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : \_\_\_\_\_ et « suffisant » : \_\_\_\_\_

# Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$  ?
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - On a  $P$  si on a  $Q$  ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$  ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : \_\_\_\_\_ et «  $P$  seulement si  $Q$  » : \_\_\_\_\_
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : \_\_\_\_\_ et « suffisant » : \_\_\_\_\_

# Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$  ?
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - On a  $P$  si on a  $Q$  ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$  ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : \_\_\_\_\_ et «  $P$  seulement si  $Q$  » : \_\_\_\_\_
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : \_\_\_\_\_ et « suffisant » : \_\_\_\_\_

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$  ?
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  ?
  - On a  $P$  si on a  $Q$  ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$  ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : \_\_\_\_\_ et «  $P$  seulement si  $Q$  » : \_\_\_\_\_
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : \_\_\_\_\_ et « suffisant » : \_\_\_\_\_

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ?
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ?
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ?
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : \_\_\_\_\_ et «  $P$  seulement si  $Q$  » : \_\_\_\_\_
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : \_\_\_\_\_ et « suffisant » : \_\_\_\_\_

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ?
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ?
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : et «  $P$  seulement si  $Q$  » :
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : et « suffisant » :



## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ?
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : et «  $P$  seulement si  $Q$  » :
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  : « nécessaire » : et « suffisant » :

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ?
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : et «  $P$  seulement si  $Q$  » :
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  : « nécessaire » : et « suffisant » :

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ?

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : et «  $P$  seulement si  $Q$  » :
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  : « nécessaire » : et « suffisant » :

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ? **Vrai**
- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : \_\_\_\_\_ et «  $P$  seulement si  $Q$  » : \_\_\_\_\_
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : \_\_\_\_\_ et « suffisant » : \_\_\_\_\_

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ? **Vrai**

- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :

- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » : \_\_\_\_\_ et «  $P$  seulement si  $Q$  » : \_\_\_\_\_
- Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » : \_\_\_\_\_ et « suffisant » : \_\_\_\_\_

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ? **Vrai**
- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :
- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » :  $Q \Rightarrow P$  et «  $P$  seulement si  $Q$  » :
  - Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » :                      et « suffisant » :

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ? **Vrai**
- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :
- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » :  $Q \Rightarrow P$  et «  $P$  seulement si  $Q$  » :  $P \Rightarrow Q$
  - Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » :                      et « suffisant » :

## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ? **Vrai**
- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :
- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » :  $Q \Rightarrow P$  et «  $P$  seulement si  $Q$  » :  $P \Rightarrow Q$
  - Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » :  $Q \Rightarrow P$  et « suffisant » :



## Les connecteurs

- ①  $P \Rightarrow Q$  signifie «  $Q$  est vraie ou  $P$  est fausse » soit :

$Q$  ou  $\text{non}P$

- Sa négation est :  $\text{non}Q$  et  $P$
  - Sa contraposée est :  $\text{non}Q \Rightarrow \text{non}P$
- ②  $P \Rightarrow Q$  se traduit par (Vrai/Faux) :
- $P$  implique  $Q$ ,  $P$  donc  $Q$ ? **Vrai**
  - Il faut  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - Il suffit d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Vrai**
  - Il est nécessaire d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  si on a  $Q$ ? **Faux**
  - On a  $P$  seulement si on a  $Q$ ? **Vrai**
- ③ Retrouvez les connecteurs en jeu dans :
- $P$  si et seulement si  $Q$  : «  $P$  si  $Q$  » :  $Q \Rightarrow P$  et «  $P$  seulement si  $Q$  » :  $P \Rightarrow Q$
  - Il est nécessaire et suffisant d'avoir  $P$  pour avoir  $Q$  :  
« nécessaire » :  $Q \Rightarrow P$  et « suffisant » :  $P \Rightarrow Q$

## Les principaux modes de raisonnement

- **le raisonnement déductif.** Montrer que il est suffisant que  $n$  soit pair pour que  $n^2$  soit pair.
- **le raisonnement par contraposition.** Montrer qu'il est nécessaire que  $n$  soit pair pour que  $n^2$  soit pair.
- **le raisonnement par l'absurde.** Montrer que  $\sqrt{2}$  est irrationnel.
- **le raisonnement par récurrence.** Montrer que

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E$  :
- $A$  n'est pas inclus dans  $E$  :
- $z \in E \times F$  :
- $f = g$  :
- $f \neq g$  :
- $y \in f(A)$  :
- $x \in f^{-1}(B)$  :

## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E : \forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$
- $A$  n'est pas inclus dans  $E$  :
- $z \in E \times F$  :
- $f = g$  :
- $f \neq g$  :
- $y \in f(A)$  :
- $x \in f^{-1}(B)$  :

## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E : \forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$
- $A$  n'est pas inclus dans  $E : \exists x/x \in A$  et  $x \notin E$
- $z \in E \times F :$
- $f = g :$
- $f \neq g :$
- $y \in f(A) :$
- $x \in f^{-1}(B) :$

## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E : \forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$
- $A$  n'est pas inclus dans  $E : \exists x/x \in A$  et  $x \notin E$
- $z \in E \times F : \exists x \in E$  et  $\exists y \in F/z = (x, y)$
- $f = g :$
- $f \neq g :$
- $y \in f(A) :$
- $x \in f^{-1}(B) :$

## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E : \forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$
- $A$  n'est pas inclus dans  $E : \exists x/x \in A$  et  $x \notin E$
- $z \in E \times F : \exists x \in E$  et  $\exists y \in F/z = (x, y)$
- $f = g : \forall x \in E, f(x) = g(x)$
- $f \neq g :$
- $y \in f(A) :$
- $x \in f^{-1}(B) :$

## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E : \forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$
- $A$  n'est pas inclus dans  $E : \exists x/x \in A$  et  $x \notin E$
- $z \in E \times F : \exists x \in E$  et  $\exists y \in F/z = (x, y)$
- $f = g : \forall x \in E, f(x) = g(x)$
- $f \neq g : \exists x \in E/f(x) \neq g(x)$
- $y \in f(A) :$
- $x \in f^{-1}(B) :$



## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E : \forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$
- $A$  n'est pas inclus dans  $E : \exists x/x \in A$  et  $x \notin E$
- $z \in E \times F : \exists x \in E$  et  $\exists y \in F/z = (x, y)$
- $f = g : \forall x \in E, f(x) = g(x)$
- $f \neq g : \exists x \in E/f(x) \neq g(x)$
- $y \in f(A) : \exists x \in A/f(x) = y$
- $x \in f^{-1}(B) :$

## Eléments de langage symbolique

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles,  $f$  et  $g$  deux applications de  $E$  dans  $F$ .  
Traduire :

- $A \subset E : \forall x, x \in A \Rightarrow x \in E$
- $A$  n'est pas inclus dans  $E : \exists x/x \in A$  et  $x \notin E$
- $z \in E \times F : \exists x \in E$  et  $\exists y \in F/z = (x, y)$
- $f = g : \forall x \in E, f(x) = g(x)$
- $f \neq g : \exists x \in E/f(x) \neq g(x)$
- $y \in f(A) : \exists x \in A/f(x) = y$
- $x \in f^{-1}(B) : f(x) \in B$

# Injectivité/surjectivité/bijektivité

Soit  $f \in \mathcal{A}(E, F)$ . Comment montrez-vous que :

- $f$  est **injective** :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- $f$  est **surjective** :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- $f$  est **bijective** :

## Injectivité/surjectivité/bijektivité

Soit  $f \in \mathcal{A}(E, F)$ . Comment montrez-vous que :

- $f$  est **injective** : Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **au plus** un antécédant ou encore

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

- $f$  est **surjective** :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- $f$  est **bijective** :

## Injectivité/surjectivité/bijektivité

Soit  $f \in \mathcal{A}(E, F)$ . Comment montrez-vous que :

- $f$  est **injective** : Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **au plus** un antécédant ou encore

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

- $f$  est **surjective** : Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **au moins** un antécédant ou  $f(E) = F$  ou encore

$$\forall y \in F, \exists x \in E / f(x) = y$$

- $f$  est **bijective** :

## Injectivité/surjectivité/bijektivité

Soit  $f \in \mathcal{A}(E, F)$ . Comment montrez-vous que :

- $f$  est **injective** : Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **au plus** un antécédant ou encore

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

- $f$  est **surjective** : Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **au moins** un antécédant ou  $f(E) = F$  ou encore

$$\forall y \in F, \exists x \in E / f(x) = y$$

- $f$  est **bijective** :  $f$  est à la fois injective et surjective. Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **un unique** antécédant ou encore

$$\forall y \in F, \exists! x \in E / f(x) = y$$

## Injectivité/surjectivité/bijektivité

Soit  $f \in \mathcal{A}(E, F)$ . Comment montrez-vous que :

- $f$  est **injective** : Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **au plus** un antécédant ou encore

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

- $f$  est **surjective** : Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **au moins** un antécédant ou  $f(E) = F$  ou encore

$$\forall y \in F, \exists x \in E / f(x) = y$$

- $f$  est **bijective** :  $f$  est à la fois injective et surjective. Tout élément de l'ensemble d'arrivée possède **un unique** antécédant ou encore

$$\forall y \in F, \exists! x \in E / f(x) = y$$

**Ne pas oublier** :  $f$  est bijective si et seulement si :

$\exists g \in \mathcal{A}(F, E) / g \circ f = id_E$  et  $f \circ g = id_F$ .

$g$  est alors unique, bijective, on la note  $f^{-1}$ .

## Sommes des termes d'une suite numérique usuelle

- Cas d'une suite géométrique définie par  $u = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=1}^n u_k =$$

$$\sum_{k=0}^n u_k =$$

- Cas d'une suite arithmétique définie par  $u = (u_0 + nr)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=0}^n u_k =$$

$$\sum_{k=a}^b u_k =$$

**Application :**  $\sum_{k=1}^n k =$



## Sommes des termes d'une suite numérique usuelle

- Cas d'une suite géométrique définie par  $u = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=1}^n u_k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\sum_{k=0}^n u_k =$$

- Cas d'une suite arithmétique définie par  $u = (u_0 + nr)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=0}^n u_k =$$

$$\sum_{k=a}^b u_k =$$

**Application :**  $\sum_{k=1}^n k =$

## Sommes des termes d'une suite numérique usuelle

- Cas d'une suite géométrique définie par  $u = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=1}^n u_k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- Cas d'une suite arithmétique définie par  $u = (u_0 + nr)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=0}^n u_k =$$

$$\sum_{k=a}^b u_k =$$

**Application :**  $\sum_{k=1}^n k =$

## Sommes des termes d'une suite numérique usuelle

- Cas d'une suite géométrique définie par  $u = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=1}^n u_k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- Cas d'une suite arithmétique définie par  $u = (u_0 + nr)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=0}^n u_k = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

$$\sum_{k=a}^b u_k =$$

**Application :**  $\sum_{k=1}^n k =$

## Sommes des termes d'une suite numérique usuelle

- Cas d'une suite géométrique définie par  $u = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=1}^n u_k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- Cas d'une suite arithmétique définie par  $u = (u_0 + nr)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=0}^n u_k = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

$$\sum_{k=a}^b u_k = (b - a + 1) \frac{u_a + u_b}{2}$$

**Application :**  $\sum_{k=1}^n k =$

## Sommes des termes d'une suite numérique usuelle

- Cas d'une suite géométrique définie par  $u = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=1}^n u_k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- Cas d'une suite arithmétique définie par  $u = (u_0 + nr)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{k=0}^n u_k = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

$$\sum_{k=a}^b u_k = (b - a + 1) \frac{u_a + u_b}{2}$$

**Application :**  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

# Manipulation des sommes

Effectuer les changements d'indice proposés :

- $\underline{j = i + 1} : \sum_{i=0}^n u_{i+1} = \sum_{j=}$

- $\underline{j = i + 2} : \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=}$

- $\underline{j = n - i} : \sum_{i=0}^n u_{n-i} = \sum_{j=}$

- $\underline{j = i - 1} : \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{j=}$

# Manipulation des sommes

Effectuer les changements d'indice proposés :

- $\underline{j = i + 1} : \sum_{i=0}^n u_{i+1} = \sum_{j=1}^{n+1} u_j$

- $\underline{j = i + 2} : \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=}$

- $\underline{j = n - i} : \sum_{i=0}^n u_{n-i} = \sum_{j=}$

- $\underline{j = i - 1} : \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{j=}$

# Manipulation des sommes

Effectuer les changements d'indice proposés :

- $\underline{j = i + 1} : \sum_{i=0}^n u_{i+1} = \sum_{j=1}^{n+1} u_j$

- $\underline{j = i + 2} : \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=2}^{n+2} u_{j-2}$

- $\underline{j = n - i} : \sum_{i=0}^n u_{n-i} = \sum_{j=0}^n u_j$

- $\underline{j = i - 1} : \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j}$



# Manipulation des sommes

Effectuer les changements d'indice proposés :

- $\underline{j = i + 1} : \sum_{i=0}^n u_{i+1} = \sum_{j=1}^{n+1} u_j$

- $\underline{j = i + 2} : \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=2}^{n+2} u_{j-2}$

- $\underline{j = n - i} : \sum_{i=0}^n u_{n-i} = \sum_{j=0}^n u_j$

- $\underline{j = i - 1} : \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j}$

# Manipulation des sommes

Effectuer les changements d'indice proposés :

- $\underline{j = i + 1} : \sum_{i=0}^n u_{i+1} = \sum_{j=1}^{n+1} u_j$

- $\underline{j = i + 2} : \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=2}^{n+2} u_{j-2}$

- $\underline{j = n - i} : \sum_{i=0}^n u_{n-i} = \sum_{j=0}^n u_j$

- $\underline{j = i - 1} : \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} =$

# Manipulation des sommes

Effectuer les changements d'indice proposés :

- $\underline{j = i + 1} : \sum_{i=0}^n u_{i+1} = \sum_{j=1}^{n+1} u_j$

- $\underline{j = i + 2} : \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=2}^{n+2} u_{j-2}$

- $\underline{j = n - i} : \sum_{i=0}^n u_{n-i} = \sum_{j=0}^n u_j$

- $\underline{j = i - 1} : \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = 2^{n-1}$

## identité remarquable

Soient  $n$  un entier naturel non nul,  $a$  et  $b$  deux complexes, on a :

$$a^n - b^n = (a - b) \times \dots$$

$$\textcircled{1} \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k ?$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} ?$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k} ?$$

$$\textcircled{4} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} ?$$

## identité remarquable

Soient  $n$  un entier naturel non nul,  $a$  et  $b$  deux complexes, on a :

$$a^n - b^n = (a - b) \times \dots$$

①  $\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$  ? **Vrai**

②  $\sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$  ?

③  $\sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k}$  ?

④  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$  ?

## identité remarquable

Soient  $n$  un entier naturel non nul,  $a$  et  $b$  deux complexes, on a :

$$a^n - b^n = (a - b) \times \dots$$

①  $\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$  ? **Vrai**

②  $\sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$  ? **Faux**

③  $\sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k}$  ?

④  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$  ?

## identité remarquable

Soient  $n$  un entier naturel non nul,  $a$  et  $b$  deux complexes, on a :

$$a^n - b^n = (a - b) \times \dots$$

①  $\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$  ? **Vrai**

②  $\sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$  ? **Faux**

③  $\sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k}$  ? **Faux**

④  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$  ?

## identité remarquable

Soient  $n$  un entier naturel non nul,  $a$  et  $b$  deux complexes, on a :

$$a^n - b^n = (a - b) \times \dots$$

①  $\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$  ? **Vrai**

②  $\sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$  ? **Faux**

③  $\sum_{k=0}^n \binom{k}{n} a^k b^{n-k}$  ? **Faux**

④  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$  ? **Faux**



# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n =$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k =$

- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k =$  ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k =$  ;

- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k =$

- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k =$  ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k =$  ;

- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n ; \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k =$

- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k =$  ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k =$  ;

- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$

- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k =$  ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k =$  ;

- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$

- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$
- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 1$ ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k =$  ;
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} =$
- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$
- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$
- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 1$ ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 2^n$ ;
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} =$
- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$
- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$
- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 1$ ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 2^n$ ;
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} = \left(\frac{3}{2}\right)^n$
- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} =$  ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$
- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$
- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 1$ ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 2^n$ ;
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} = \left(\frac{3}{2}\right)^n$
- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$ ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} =$
- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$



# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n; \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$

- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 1; \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 2^n;$

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} = \left(\frac{3}{2}\right)^n$$

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}; \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$

- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ;  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$
- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 1$ ;  $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 2^n$ ;
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} = \left(\frac{3}{2}\right)^n$
- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$ ;  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$
- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n [k(k-1) + k] \binom{n}{k} =$

# Binôme de Newton

**Rappel :**  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, n \in \mathbb{N}^*, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

**Applications :**

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n; \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k = (a + 1)^n$

- $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 1; \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} 2^k = 3^n - 2^n;$

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \binom{n}{k} = \left(\frac{3}{2}\right)^n$$

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}; \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$

- $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n [k(k-1) + k] \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$

## Manipulation des sommes (suite)

- $$\sum_{k=1}^n u_k + \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = \sum_{k=1}^{2n} u_k$$

- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} + \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=0}^{2n+1} u_k$$
- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} - \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k u_k$$

Calculer  $A_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$  et  $B_n = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$  :

## Manipulation des sommes (suite)

- $$\sum_{k=1}^n u_k + \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = \sum_{k=1}^{2n} u_k$$
- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} + \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=0}^{2n+1} u_k$$
- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} - \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} u_k$$

Calculer  $A_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$  et  $B_n = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$  :

## Manipulation des sommes (suite)

- $$\sum_{k=1}^n u_k + \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = \sum_{k=1}^{2n} u_k$$

- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} + \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} u_k$$

$$\sum_{k=1}^n u_{2k} - \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} u_k$$

Calculer  $A_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$  et  $B_n = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$  :

## Manipulation des sommes (suite)

- $$\sum_{k=1}^n u_k + \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = \sum_{k=1}^{2n} u_k$$

- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} + \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} u_k$$

$$\sum_{k=1}^n u_{2k} - \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k u_k$$

Calculer  $A_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$  et  $B_n = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$  :

## Manipulation des sommes (suite)

- $$\sum_{k=1}^n u_k + \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = \sum_{k=1}^{2n} u_k$$
- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} + \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} u_k$$
- $$\sum_{k=1}^n u_{2k} - \sum_{k=0}^n u_{2k+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k u_k$$

Calculer  $A_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$  et  $B_n = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$  :

$$A_n + B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \text{ et } A_n - B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0. \text{ Soit}$$

$$A_n = B_n = 2^{n-1}$$



## les sommes classiques

- $\sum_{i=1}^n 1 =$

- $\sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j =$

- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i + j) =$

- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1 =$

- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{j}{i} =$

## les sommes classiques

- $\sum_{i=1}^n 1 = n$

- $\sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j =$

- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i + j) =$

- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1 =$

- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{j}{i} =$

## les sommes classiques

- $\sum_{i=1}^n 1 = n$
- $\sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) =$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1 =$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{j}{i} =$

## les sommes classiques

- $\sum_{i=1}^n 1 = n$

- $\sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$

- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n (i+j) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n j =$

- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1 =$

- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{j}{i} =$

## les sommes classiques

- $\sum_{i=1}^n 1 = n$
- $\sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = n^2(n+1)$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1 =$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{j}{i} =$

## les sommes classiques

- $\sum_{i=1}^n 1 = n$
- $\sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = n^2(n+1)$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1 = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{j}{i} =$

## les sommes classiques

- $\sum_{i=1}^n 1 = n$
- $\sum_{i=1}^n i + \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = n^2(n+1)$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1 = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{j}{i} = \frac{n(n+3)}{4}$

# Télescopes et formule de Pascal

- **Télescopes** : 
$$\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) =$$

*Application* : 
$$\sum_{k=0}^n q^k (1 - q) =$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) =$$

- **Formule de Pascal** : 
$$\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} =$$

*Application* : Montrer que 
$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}, \forall 0 \leq p \leq n$$



# Télescopes et formule de Pascal

- **Télescopes** : 
$$\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$$

*Application* : 
$$\sum_{k=0}^n q^k (1 - q) =$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) =$$

- **Formule de Pascal** : 
$$\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} =$$

*Application* : Montrer que 
$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}, \forall 0 \leq p \leq n$$

## Télescopes et formule de Pascal

- **Télescopes** : 
$$\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$$

*Application* : 
$$\sum_{k=0}^n q^k (1 - q) = \sum_{k=0}^n (q^k - q^{k+1}) = 1 - q^{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) =$$

- **Formule de Pascal** : 
$$\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} =$$

*Application* : Montrer que 
$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}, \forall 0 \leq p \leq n$$

## Télescopes et formule de Pascal

- **Télescopes** :  $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$

*Application* :  $\sum_{k=0}^n q^k(1 - q) = \sum_{k=0}^n (q^k - q^{k+1}) = 1 - q^{n+1}$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

- **Formule de Pascal** :  $\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} =$

*Application* : Montrer que  $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}, \forall 0 \leq p \leq n$

## Télescopes et formule de Pascal

- **Télescopes** :  $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$

$$\text{Application : } \sum_{k=0}^n q^k(1 - q) = \sum_{k=0}^n (q^k - q^{k+1}) = 1 - q^{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

- **Formule de Pascal** :  $\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} = \binom{k+1}{p+1}$

$$\text{Application : Montrer que } \sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}, \forall 0 \leq p \leq n$$

# Table des matières

- 1 Logique et sommes usuelles
- 2 Nombres complexes et trigonométrie
- 3 Polynômes

# Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec

$$|z| = \quad \quad \quad \text{et } \cos(\theta) = \quad \quad \quad , \sin(\theta) =$$

- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = \quad \quad \quad$  et  
 $\arg(z) =$

- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \quad \quad \quad$  et  $\arg(z) =$

- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

$$|zz'| = 6 \quad \quad \quad ; |z + z'| = 5$$

$$|z' - z| \leq 1 \quad \quad \quad ; |z + z'| \leq 5 \quad \quad \quad ; \left| \frac{z}{z'} \right| < 1$$

# Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| =$                       et  
 $\arg(z) =$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| =$                       et  $\arg(z) =$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$                       ;  $|z + z'| = 5$   
 $|z' - z| \leq 1$                       ;  $|z + z'| \leq 5$                       ;  $|\frac{z}{z'}| < 1$

## Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = |z_1||z_2|$  et  
 $\arg(z) = \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg(z) = \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$  ;  $|z + z'| = 5$   
 $|z' - z| \leq 1$  ;  $|z + z'| \leq 5$  ;  $|\frac{z}{z'}| < 1$



## Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = |z_1| |z_2|$  et  
 $\arg(z) = \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg(z) = \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$  ;  $|z + z'| = 5$   
 $|z' - z| \leq 1$  ;  $|z + z'| \leq 5$  ;  $|\frac{z}{z'}| < 1$

## Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = |z_1||z_2|$  et  
 $\arg(z) = \arg(z_1) + \arg(z_2)[2\pi]$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg(z) = \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi]$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$  (**VRAI**) ;  $|z + z'| = 5$   
 $|z' - z| \leq 1$  ;  $|z + z'| \leq 5$  ;  $|\frac{z}{z'}| < 1$

## Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = |z_1||z_2|$  et  
 $\arg(z) = \arg(z_1) + \arg(z_2)[2\pi]$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg(z) = \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi]$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$  (**VRAI**) ;  $|z + z'| = 5$  (**FAUX**)  
 $|z' - z| \leq 1$  ;  $|z + z'| \leq 5$  ;  $|\frac{z}{z'}| < 1$

## Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = |z_1||z_2|$  et  
 $\arg(z) = \arg(z_1) + \arg(z_2)[2\pi]$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg(z) = \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi]$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$  (**VRAI**);  $|z + z'| = 5$  (**FAUX**)  
 $|z' - z| \leq 1$  (**FAUX**);  $|z + z'| \leq 5$  ;  $|\frac{z}{z'}| < 1$

## Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = |z_1||z_2|$  et  
 $\arg(z) = \arg(z_1) + \arg(z_2)[2\pi]$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg(z) = \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi]$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$  (**VRAI**);  $|z + z'| = 5$  (**FAUX**)  
 $|z' - z| \leq 1$  (**FAUX**);  $|z + z'| \leq 5$  (**VRAI**);  $|\frac{z}{z'}| < 1$

## Formes trigonométriques

- soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Alors  $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$  avec  
 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$  et  $\cos(\theta) = x/|z|$ ,  $\sin(\theta) = y/|z|$
- Si  $z = z_1 z_2$  alors  $|z| = |z_1| |z_2|$  et  
 $\arg(z) = \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
- Si  $z = \frac{z_1}{z_2}$  alors  $|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$  et  $\arg(z) = \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
- Soit  $(z, z') \in \mathbb{C}^2 / |z| = 2$  et  $|z'| = 3$ . Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  
 $|zz'| = 6$  (**VRAI**);  $|z + z'| = 5$  (**FAUX**)  
 $|z' - z| \leq 1$  (**FAUX**);  $|z + z'| \leq 5$  (**VRAI**);  $|\frac{z}{z'}| < 1$  (**VRAI**)

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

- ① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  ;

$$z - z' \quad , \quad zz' \quad \frac{z}{z'} \quad ?$$

- ② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  ;

$$z - z' \quad ;$$

$$zz' \quad \frac{z}{z'}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^* ; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

- ① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z', \quad zz', \quad \frac{z}{z'} \quad ?$$

- ② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  ;

$$z - z' \quad ;$$

$$zz' \quad \frac{z}{z'}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^* ; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$



## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

- ① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz', \frac{z}{z'} \quad ?$$

- ② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  ;

$$z - z' \quad ;$$

$$zz', \frac{z}{z'}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^* ; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

- ① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**) ;

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz' \text{ (**oui** : } \theta + \theta' \text{)} \quad \frac{z}{z'} \quad ?$$

- ② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  ;

$$z - z' \quad ;$$

$$zz' \quad \frac{z}{z'}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^* ; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$z - z'$  (**non**),  $zz'$  (**oui** :  $\theta + \theta'$ )  $\frac{z}{z'}$  (**oui** :  $\theta - \theta'$ ) ?

② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  ;

$z - z'$  ;

$zz'$   $\frac{z}{z'}$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^* ; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

- ① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz' \text{ (**oui** : } \theta + \theta') \frac{z}{z'} \text{ (**oui** : } \theta - \theta')$$

- ② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  (**oui** :  $\theta$ );

$$z - z'$$

$$zz' \quad \frac{z}{z'}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^* ; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz' \text{ (**oui** : } \theta + \theta') \frac{z}{z'} \text{ (**oui** : } \theta - \theta')$$

② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  (**oui** :  $\theta$ );

$$z - z' \text{ (**non, cela dépend du signe de } (|z| - |z'|)) \text{);}**$$

$$zz' \quad \frac{z}{z'}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^*; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

- ① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz' \text{ (**oui** : } \theta + \theta') \frac{z}{z'} \text{ (**oui** : } \theta - \theta')$$

- ② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  (**oui** :  $\theta$ );

$$z - z' \text{ (**non, cela dépend du signe de } (|z| - |z'|)) \text{);}**$$

$$zz' \text{ (**oui**) } \frac{z}{z'}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^*; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz' \text{ (**oui** : } \theta + \theta') \frac{z}{z'} \text{ (**oui** : } \theta - \theta')$$

② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  (**oui** :  $\theta$ );

$$z - z' \text{ (**non, cela dépend du signe de } (|z| - |z'|)) \text{);}**$$

$$zz' \text{ (**oui**) } \frac{z}{z'} \text{ (**oui**)}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^*; z =$$

$$z = 1 + itan\theta =$$

## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz' \text{ (**oui** : } \theta + \theta') \frac{z}{z'} \text{ (**oui** : } \theta - \theta')$$

② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  (**oui** :  $\theta$ );

$$z - z' \text{ (**non, cela dépend du signe de } (|z| - |z'|)) \text{);}**$$

$$zz' \text{ (**oui**) } \frac{z}{z'} \text{ (**oui**)}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^*; z = \begin{cases} re^{i\theta} & \text{si } r > 0 \\ -re^{i(\theta+\pi)} & \text{si } r < 0 \end{cases}$$

$$z = 1 + itan\theta =$$



## Formes trigonométriques (suite)

Soient  $z$  et  $z'$  2 nombres complexes non nuls d'arguments  $\theta$  et  $\theta'$ .

- ① Peut-on connaître les arguments des nombres :  $z + z'$  (**non**);

$$z - z' \text{ (**non**)}, zz' \text{ (**oui** : } \theta + \theta') \frac{z}{z'} \text{ (**oui** : } \theta - \theta')$$

- ② Même question en supposant que  $\theta = \theta'$  :  $z + z'$  (**oui** :  $\theta$ );

$$z - z' \text{ (**non, cela dépend du signe de } (|z| - |z'|)) \text{);}**$$

$$zz' \text{ (**oui**) } \frac{z}{z'} \text{ (**oui**)}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = re^{i\theta}, r \in \mathbb{R}^*; z = \begin{cases} re^{i\theta} & \text{si } r > 0 \\ -re^{i(\theta+\pi)} & \text{si } r < 0 \end{cases}$$

$$z = 1 + itan\theta = \begin{cases} \frac{1}{\cos(\theta)} e^{i\theta} & \text{si } \theta \in ] - \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} [[ [2\pi] \\ -\frac{1}{\cos(\theta)} e^{i(\theta+\pi)} & \text{si } \theta \in ] \frac{\pi}{2}; 3\frac{\pi}{2} [[ [2\pi] \end{cases}$$

# Angles usuels

Mettre sous forme algébrique :

- $e^{i\pi/2} = \quad ; e^{i3\pi/2} = \quad ; e^{i\pi} = \quad$
- $e^{i\pi/6} = \quad ; e^{i\pi/3} = \quad$
- $e^{i\pi/4} = \quad ; e^{3i\pi/4} = \quad$
- $e^{2i\pi/3} = \quad = j ; e^{-i\pi/3} = \quad ;$   
 $e^{-2i\pi/3} = \quad$

# Angles usuels

Mettre sous forme algébrique :

- $e^{i\pi/2} = i$ ;  $e^{i3\pi/2} = -i$ ;  $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\pi/6} =$  ;  $e^{i\pi/3} =$
- $e^{i\pi/4} =$  ;  $e^{3i\pi/4} =$
- $e^{2i\pi/3} =$  ;  $e^{-i\pi/3} =$  ;  
 $e^{-2i\pi/3} =$

# Angles usuels

Mettre sous forme algébrique :

- $e^{i\pi/2} = i$ ;  $e^{3\pi/2} = -i$ ;  $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\pi/6} = \sqrt{3}/2 + i/2$ ;  $e^{i\pi/3} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$
- $e^{i\pi/4} =$  ;  $e^{3\pi/4} =$
- $e^{2i\pi/3} =$  ;  $e^{-i\pi/3} =$  ;
- $e^{-2i\pi/3} =$

# Angles usuels

Mettre sous forme algébrique :

- $e^{i\pi/2} = i$ ;  $e^{i3\pi/2} = -i$ ;  $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\pi/6} = \sqrt{3}/2 + i/2$ ;  $e^{i\pi/3} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$
- $e^{i\pi/4} = \sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$ ;  $e^{3i\pi/4} = -\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$
- $e^{2i\pi/3} = \qquad \qquad \qquad = j$ ;  $e^{-i\pi/3} = \qquad \qquad \qquad ;$   
 $e^{-2i\pi/3} = \qquad \qquad \qquad$

## Angles usuels

Mettre sous forme algébrique :

- $e^{i\pi/2} = i$ ;  $e^{i3\pi/2} = -i$ ;  $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\pi/6} = \sqrt{3}/2 + i/2$ ;  $e^{i\pi/3} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$
- $e^{i\pi/4} = \sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$ ;  $e^{3i\pi/4} = -\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$
- $e^{2i\pi/3} = -1/2 + i\sqrt{3}/2 = j$ ;  $e^{-i\pi/3} =$  ;  
 $e^{-2i\pi/3} =$

## Angles usuels

Mettre sous forme algébrique :

- $e^{i\pi/2} = i$ ;  $e^{i3\pi/2} = -i$ ;  $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\pi/6} = \sqrt{3}/2 + i/2$ ;  $e^{i\pi/3} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$
- $e^{i\pi/4} = \sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$ ;  $e^{3i\pi/4} = -\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$
- $e^{2i\pi/3} = -1/2 + i\sqrt{3}/2 = j$ ;  $e^{-i\pi/3} = 1/2 - i\sqrt{3}/2 = -j$ ;  
 $e^{-2i\pi/3} =$

## Angles usuels

Mettre sous forme algébrique :

- $e^{i\pi/2} = i$ ;  $e^{i3\pi/2} = -i$ ;  $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\pi/6} = \sqrt{3}/2 + i/2$ ;  $e^{i\pi/3} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$
- $e^{i\pi/4} = \sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$ ;  $e^{3i\pi/4} = -\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2$
- $e^{2i\pi/3} = -1/2 + i\sqrt{3}/2 = j$ ;  $e^{-i\pi/3} = 1/2 - i\sqrt{3}/2 = -j$ ;  
 $e^{-2i\pi/3} = -1/2 - i\sqrt{3}/2 = j^2 = \bar{j}$



# Formules d'Euler

## Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} =$
- $e^{ia} - e^{ib} =$
- $e^{ia} + 1 =$
- $e^{ia} - 1 =$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} =$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**

# Formules d'Euler

## Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \cos a + \cos b =$
- $e^{ia} - e^{ib} =$
- $e^{ia} + 1 =$
- $e^{ia} - 1 =$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} =$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**

# Formules d'Euler

## Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \cos a + \cos b = 2\cos\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} - e^{ib} =$
- $e^{ia} + 1 =$
- $e^{ia} - 1 =$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} =$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**

# Formules d'Euler

## Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \cos a + \cos b = 2\cos\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} - e^{ib} = 2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \sin a - \sin b =$
- $e^{ia} + 1 =$
- $e^{ia} - 1 =$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} =$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**

# Formules d'Euler

## Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \cos a + \cos b = 2\cos\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} - e^{ib} = 2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \sin a - \sin b = 2\sin\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} + 1 =$
- $e^{ia} - 1 =$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} =$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**

# Formules d'Euler

## Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \cos a + \cos b = 2\cos\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} - e^{ib} = 2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \sin a - \sin b = 2\sin\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} + 1 = 2\cos\left(\frac{a}{2}\right)e^{i\frac{a}{2}}$
- $e^{ia} - 1 =$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} =$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**

# Formules d'Euler

## Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \cos a + \cos b = 2\cos\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} - e^{ib} = 2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \sin a - \sin b = 2\sin\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} + 1 = 2\cos\left(\frac{a}{2}\right)e^{i\frac{a}{2}}$
- $e^{ia} - 1 = 2i\sin\left(\frac{a}{2}\right)e^{i\frac{a}{2}}$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} =$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**

## Formules d'Euler

### Rappel

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Mettre sous forme trigonométrique :

- $e^{ia} + e^{ib} = 2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \cos a + \cos b = 2\cos\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} - e^{ib} = 2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i\frac{a+b}{2}} \Rightarrow \sin a - \sin b = 2\sin\frac{a-b}{2} \cdot \cos\frac{a+b}{2}$
- $e^{ia} + 1 = 2\cos\left(\frac{a}{2}\right)e^{i\frac{a}{2}}$
- $e^{ia} - 1 = 2i\sin\left(\frac{a}{2}\right)e^{i\frac{a}{2}}$
- $e^{i\pi/2} \frac{e^{-ib} - 1}{e^{-ib} + 1} = i \frac{-2i\sin(b/2)}{2\cos(b/2)} = \tan(b/2)$

Autre application, associée au binôme de Newton : **Linéarisation**





## Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

- $\cos(a + b) =$  ;  
 $\cos(a - b) =$

- $\sin(a + b) =$  ;  
 $\sin(a - b) =$

- $\tan(a + b) =$  ;  $\tan(a - b) =$

- $\sin 2a =$  ;  
 $\cos 2a =$

- $\sin a \cdot \cos b =$

- $\sin a \cdot \sin b =$

- $\cos a \cdot \cos b =$

# Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  ;  
 $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) =$  ;  
 $\sin(a - b) =$
- $\tan(a + b) =$  ;  $\tan(a - b) =$
- $\sin 2a =$  ;  
 $\cos 2a =$
- $\sin a \cdot \cos b =$
- $\sin a \cdot \sin b =$
- $\cos a \cdot \cos b =$

## Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  ;  
 $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$  ;  
 $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\tan(a + b) =$  ;  $\tan(a - b) =$
- $\sin 2a =$  ;  
 $\cos 2a =$
- $\sin a \cdot \cos b =$
- $\sin a \cdot \sin b =$
- $\cos a \cdot \cos b =$

## Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  ;  
 $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$  ;  
 $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$  ;  $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$
- $\sin 2a =$  ;  
 $\cos 2a =$
- $\sin a \cdot \cos b =$
- $\sin a \cdot \sin b =$
- $\cos a \cdot \cos b =$

## Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  ;  
 $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$  ;  
 $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$  ;  $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$  ;  
 $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
- $\sin a \cdot \cos b =$
- $\sin a \cdot \sin b =$
- $\cos a \cdot \cos b =$

## Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  ;  
 $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$  ;  
 $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$  ;  $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$  ;  
 $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
- $\sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$
- $\sin a \cdot \sin b =$
- $\cos a \cdot \cos b =$

## Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  ;  
 $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$  ;  
 $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$  ;  $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$  ;  
 $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
- $\sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$
- $\sin a \cdot \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
- $\cos a \cdot \cos b =$



## Formules trigo

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$  ou encore  $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$  ;  
 $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$  ;  
 $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$  ;  $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$
- $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$  ;  
 $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
- $\sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$
- $\sin a \cdot \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
- $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$

# racines n-ièmes de l'unité

- 1 Les racines carrées de l'unité sont :
- 2 Les racines cubiques de l'unité sont :

*Propriétés* :  $1 + j + j^2 = 0$  ;  $\forall p \in \mathbb{N}, j^{3p} = 1, j^{3p+1} = j$  et  $j^{3p+2} = j^2$

# racines n-ièmes de l'unité

- 1 Les racines carrées de l'unité sont : 1 et  $-1$
- 2 Les racines cubiques de l'unité sont :

*Propriétés* :  $1 + j + j^2 = 0$  ;  $\forall p \in \mathbb{N}, j^{3p} = 1, j^{3p+1} = j$  et  $j^{3p+2} = j^2$

# racines n-ièmes de l'unité

- ① Les racines carrées de l'unité sont : 1 et  $-1$
- ② Les racines cubiques de l'unité sont : 1,  $j$  et  $j^2$  avec

$$j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et}$$

$$j^2 = e^{4i\pi/3} = e^{-2i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{j}$$

Propriétés :  $1 + j + j^2 =$  ;  $\forall p \in \mathbb{N}, j^{3p} =$  ,  $j^{3p+1} =$  et  
 $j^{3p+2} =$

## racines n-ièmes de l'unité

- ① Les racines carrées de l'unité sont : 1 et  $-1$
- ② Les racines cubiques de l'unité sont : 1,  $j$  et  $j^2$  avec

$$j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et}$$
$$j^2 = e^{4i\pi/3} = e^{-2i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{j}$$

*Propriétés* :  $1 + j + j^2 = 0$  ;  $\forall p \in \mathbb{N}, j^{3p} = 1, j^{3p+1} = j$  et  $j^{3p+2} = j^2$

## racines carrées d'un nombre complexe

**Un exemple** : Résoudre de deux manières différentes  $z^2 = j$

- Méthode trigonométrique :  $z = re^{i\theta}$ ,  $r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Méthode algébrique : On pose  $z = a + ib$ ,  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

## racines carrées d'un nombre complexe

**Un exemple** : Résoudre de deux manières différentes  $z^2 = j$

- Méthode trigonométrique :  $z = re^{i\theta}$ ,  $r > 0$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$

$$z^2 = j \Leftrightarrow r^2 e^{2i\theta} = e^{2i\pi/3} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} r^2 = 1 \\ 2\theta = 2\pi/3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} r = 1 \\ \theta = \pi/3 + k\pi, 0 \leq k < 2 \end{cases}$$

- Méthode algébrique : On pose  $z = a + ib$ ,  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

## racines carrées d'un nombre complexe

**Un exemple** : Résoudre de deux manières différentes  $z^2 = j$

- Méthode trigonométrique :  $z = re^{i\theta}$ ,  $r > 0$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$

$$z^2 = j \Leftrightarrow \begin{cases} r = 1 \\ \theta = \pi/3 + k\pi, 0 \leq k < 2 \end{cases} ;$$

**Concl.** :  $\mathcal{S} = \{e^{i\pi/3}, e^{4i\pi/3} = j^2\}$

- Méthode algébrique : On pose  $z = a + ib$ ,  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$



# racines carrées d'un nombre complexe

**Un exemple** : Résoudre de deux manières différentes  $z^2 = j$

- Méthode trigonométrique :  $z = re^{i\theta}$ ,  $r > 0$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$

$$z^2 = j \Leftrightarrow \begin{cases} r = 1 \\ \theta = \pi/3 + k\pi, 0 \leq k < 2 \end{cases};$$

**Concl.** :  $\mathcal{S} = \{e^{i\pi/3}, e^{4i\pi/3} = j^2\}$

- Méthode algébrique : On pose  $z = a + ib$ ,  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

$$z^2 = j \Leftrightarrow (a + ib)^2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ a^2 - b^2 = -1/2 \\ ab > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} a^2 = 1/4 \\ b^2 = 3/4, ab > 0 \end{cases}; \text{ **Concl.** : } \mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$$

## Equations du second degré à coefficients réels

Résoudre les équations suivantes :

- $z^2 + z + 1 = 0$
- $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$
- $z^2 - 2z + 5 = 0$
- $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 - 2\left(\frac{z+i}{z-i}\right) + 5 = 0$

## Equations du second degré à coefficients réels

Résoudre les équations suivantes :

- $z^2 + z + 1 = 0$  ; Deux racines évidentes  $j$  et  $\bar{j}$
- $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$
- $z^2 - 2z + 5 = 0$
- $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 - 2\left(\frac{z+i}{z-i}\right) + 5 = 0$

## Equations du second degré à coefficients réels

Résoudre les équations suivantes :

- $z^2 + z + 1 = 0$  ; Deux racines évidentes  $j$  et  $\bar{j}$
- $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$   $\Delta < 0$  ;  $\mathcal{S} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$
- $z^2 - 2z + 5 = 0$
- $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 - 2\left(\frac{z+i}{z-i}\right) + 5 = 0$

## Equations du second degré à coefficients réels

Résoudre les équations suivantes :

- $z^2 + z + 1 = 0$  ; Deux racines évidentes  $j$  et  $\bar{j}$
- $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$   $\Delta < 0$  ;  $\mathcal{S} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$
- $z^2 - 2z + 5 = 0$   $\Delta = (4i)^2$  ;  $\mathcal{S} = \{1 + 2i, 1 - 2i\}$
- $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 - 2\left(\frac{z+i}{z-i}\right) + 5 = 0$

## Equations du second degré à coefficients réels

Résoudre les équations suivantes :

- $z^2 + z + 1 = 0$  ; Deux racines évidentes  $j$  et  $\bar{j}$
- $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$   $\Delta < 0$  ;  $\mathcal{S} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$
- $z^2 - 2z + 5 = 0$   $\Delta = (4i)^2$  ;  $\mathcal{S} = \{1 + 2i, 1 - 2i\}$
- $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 - 2\left(\frac{z+i}{z-i}\right) + 5 = 0$

D'après ce qui précède,  $\frac{z+i}{z-i} = 1 + 2i$  ou  $\frac{z+i}{z-i} = 1 - 2i$ .

On note que  $z = i$  n'est pas solution. On peut donc multiplier par  $z - i$ , soit :

$$z + i = (1 + 2i)(z - i) \text{ ou } z + i = (1 - 2i)(z - i)$$

**Concl** :  $\mathcal{S} = \{1 + i, -1 + i\}$

## Déterminer les racines cubiques d'un nombre complexe

Résoudre  $z^3 = a$  où  $a \in \mathbb{C}$ .

Commencer par déterminer une racine évidente  $z_0$  pour laquelle

$$z_0^3 = a. \text{ Alors } z^3 = z_0^3 \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^3 = 1 \Leftrightarrow \frac{z}{z_0} \in \{1, j, \bar{j}\}$$

**Application** : Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$  (\*)

- On pose  $Z = z^3$ . Alors (\*)  $\Leftrightarrow Z^2 - 2Z + 2 = 0$

- Résolvons (E2) :  $z^3 = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ .

Une racine évidente est

- Les coefficients de l'équation polynomiale (\*) étant réels, les racines sont conjuguées deux à deux. Ce qui permet de conclure :

## Déterminer les racines cubiques d'un nombre complexe

Résoudre  $z^3 = a$  où  $a \in \mathbb{C}$ .

Commencer par déterminer une racine évidente  $z_0$  pour laquelle

$$z_0^3 = a. \text{ Alors } z^3 = z_0^3 \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^3 = 1 \Leftrightarrow \frac{z}{z_0} \in \{1, j, \bar{j}\}$$

**Application** : Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$  (\*)

- On pose  $Z = z^3$ . Alors  $(*) \Leftrightarrow Z^2 - 2Z + 2 = 0$   
 $\Delta = -4$  donc deux racines  $Z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$   
 $(*) \Leftrightarrow z^3 = 1 - i$  (E1) ou  $z^3 = 1 + i$  (E2)
- Résolvons (E2) :  $z^3 = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ .

Une racine évidente est

- Les coefficients de l'équation polynomiale (\*) étant réels, les racines sont conjuguées deux à deux. Ce qui permet de conclure :



## Déterminer les racines cubiques d'un nombre complexe

Résoudre  $z^3 = a$  où  $a \in \mathbb{C}$ .

Commencer par déterminer une racine évidente  $z_0$  pour laquelle

$$z_0^3 = a. \text{ Alors } z^3 = z_0^3 \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^3 = 1 \Leftrightarrow \frac{z}{z_0} \in \{1, j, \bar{j}\}$$

**Application** : Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$  (\*)

- On pose  $Z = z^3$ . Alors  $(*) \Leftrightarrow Z^2 - 2Z + 2 = 0$

$$\Delta = -4 \text{ donc deux racines } Z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

$$(*) \Leftrightarrow z^3 = 1 - i \text{ (E1) ou } z^3 = 1 + i \text{ (E2)}$$

- Réolvons (E2) :  $z^3 = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ .

$$\text{Une racine évidente est } z_0 = 2^{\frac{1}{6}} e^{i\pi/12}.$$

- Les coefficients de l'équation polynomiale (\*) étant réels, les racines sont conjuguées deux à deux. Ce qui permet de conclure :

## Déterminer les racines cubiques d'un nombre complexe

Résoudre  $z^3 = a$  où  $a \in \mathbb{C}$ .

Commencer par déterminer une racine évidente  $z_0$  pour laquelle

$$z_0^3 = a. \text{ Alors } z^3 = z_0^3 \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^3 = 1 \Leftrightarrow \frac{z}{z_0} \in \{1, j, \bar{j}\}$$

**Application** : Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$  (\*)

- On pose  $Z = z^3$ . Alors (\*)  $\Leftrightarrow Z^2 - 2Z + 2 = 0$

$$\Delta = -4 \text{ donc deux racines } Z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

$$(*) \Leftrightarrow z^3 = 1 - i \text{ (E1) ou } z^3 = 1 + i \text{ (E2)}$$

- Réolvons (E2) :  $z^3 = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ .

$$\text{Une racine évidente est } z_0 = 2^{\frac{1}{6}} e^{i\pi/12}. \text{ D'où (E2)} \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^3 = 1$$

$$\text{Concl : } z = z_0 \text{ ou } z = jz_0 \text{ ou } z = \bar{j}z_0$$

- Les coefficients de l'équation polynomiale (\*) étant réels, les racines sont conjuguées deux à deux. Ce qui permet de conclure :

## Déterminer les racines cubiques d'un nombre complexe

Résoudre  $z^3 = a$  où  $a \in \mathbb{C}$ .

Commencer par déterminer une racine évidente  $z_0$  pour laquelle

$$z_0^3 = a. \text{ Alors } z^3 = z_0^3 \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^3 = 1 \Leftrightarrow \frac{z}{z_0} \in \{1, j, \bar{j}\}$$

**Application** : Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$  (\*)

- On pose  $Z = z^3$ . Alors (\*)  $\Leftrightarrow Z^2 - 2Z + 2 = 0$

$$\Delta = -4 \text{ donc deux racines } Z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

$$(*) \Leftrightarrow z^3 = 1 - i \text{ (E1) ou } z^3 = 1 + i \text{ (E2)}$$

- Réolvons (E2) :  $z^3 = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ .

$$\text{Une racine évidente est } z_0 = 2^{\frac{1}{6}} e^{i\pi/12}. \text{ D'où (E2)} \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^3 = 1$$

$$\text{Concl : } z = z_0 \text{ ou } z = jz_0 \text{ ou } z = \bar{j}z_0$$

- Les coefficients de l'équation polynomiale (\*) étant réels, les racines sont conjuguées deux à deux. Ce qui permet de conclure :  $\mathcal{S} = \{z_0, jz_0, \bar{j}z_0, \bar{z}_0, \bar{j}\bar{z}_0, j\bar{z}_0\}$

## Quelques sommes usuelles

- $S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) =$
- $S_2 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) =$

## Quelques sommes usuelles

- $S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) = \operatorname{Re} (1 + e^{ix})^n = 2^n \cos^n\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{nx}{2}\right)$
- $S_2 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) =$

## Quelques sommes usuelles

- $S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) = \mathcal{R}e (1 + e^{ix})^n = 2^n \cos^n\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{nx}{2}\right)$
- $S_2 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) = \mathcal{R}e \left( \sum_{k=0}^n e^{ikx} \right) = \mathcal{R}e \left( \sum_{k=0}^n (e^{ix})^k \right)$   
 Si  $e^{ix} = 1$ , càd  $x = 0[2\pi]$ , alors  $S_1 = n + 1$ .

## Quelques sommes usuelles

- $S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) = \mathcal{R}e (1 + e^{ix})^n = 2^n \cos^n\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{nx}{2}\right)$
- $S_2 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) = \mathcal{R}e \left( \sum_{k=0}^n e^{ikx} \right) = \mathcal{R}e \left( \sum_{k=0}^n (e^{ix})^k \right)$

Si  $e^{ix} = 1$ , càd  $x = 0[2\pi]$ , alors  $S_1 = n + 1$ .

Si  $e^{ix} \neq 1$ , càd  $x \neq 0[2\pi]$ , alors :

$$S_2 = \mathcal{R}e \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} = \mathcal{R}e \frac{e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \left( -2i \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right) \right)}{e^{i\frac{x}{2}} \left( -2i \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right)}$$

## Quelques sommes usuelles

- $S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) = \operatorname{Re} (1 + e^{ix})^n = 2^n \cos^n\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{nx}{2}\right)$
- $S_2 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) = \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^n e^{ikx} \right) = \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^n (e^{ix})^k \right)$

Si  $e^{ix} = 1$ , c.à.d.  $x = 0[2\pi]$ , alors  $S_1 = n + 1$ .

Si  $e^{ix} \neq 1$ , c.à.d.  $x \neq 0[2\pi]$ , alors :

$$S_2 = \operatorname{Re} \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} = \operatorname{Re} \frac{e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \left( -2i \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right) \right)}{e^{i\frac{x}{2}} \left( -2i \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right)}$$

**Conclusion :**  $S_1 = \frac{\cos\left(\frac{nx}{2}\right) \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$



# Table des matières

- 1 Logique et sommes usuelles
- 2 Nombres complexes et trigonométrie
- 3 Polynômes

## Dérivation et degré d'un polynôme

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$ . Alors :

$$P'(X) =$$

- Si  $\deg(P) = n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , alors,  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,

$$\deg(P^{(k)}) =$$

- Donner la dérivée  $k$ -ième de  $X^n$  :

## Dérivation et degré d'un polynôme

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$ . Alors :

$$P'(X) = \sum_{k=1}^p k a_k X^{k-1}$$

- Si  $\deg(P) = n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , alors,  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,

$$\deg(P^{(k)}) =$$

- Donner la dérivée  $k$ -ième de  $X^n$  :

## Dérivation et degré d'un polynôme

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$ . Alors :

$$P'(X) = \sum_{k=1}^p k a_k X^{k-1}$$

- Si  $\deg(P) = n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , alors,  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,

$$\deg(P^{(k)}) = \begin{cases} n - k & \text{si } 0 \leq k \leq n \\ -\infty & \text{si } k > n \end{cases}$$

- Donner la dérivée  $k$ -ième de  $X^n$  :

## Dérivation et degré d'un polynôme

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$ . Alors :

$$P'(X) = \sum_{k=1}^p k a_k X^{k-1}$$

- Si  $\deg(P) = n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , alors,  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,

$$\deg(P^{(k)}) = \begin{cases} n - k & \text{si } 0 \leq k \leq n \\ -\infty & \text{si } k > n \end{cases}$$

- Donner la dérivée  $k$ -ième de  $X^n$  :

$$(X^n)^{(k)} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k} & \text{si } 0 \leq k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X]$ ,  $\deg(P \cdot Q) =$  ;  
 $\deg(P + Q)$

- $\deg(AP') =$  ;  $\deg(BP) =$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP)$
- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q)$

- $\deg(AP') =$  ;  $\deg(BP) =$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP)$
- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k, a_p \neq 0$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

- $\deg(AP') =$  ;  $\deg(BP) =$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP)$
- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k, a_p \neq 0$



## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

*Application* : Soit  $A(X) = aX^n, B(X) = bX^{n-1}$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^*$  et  
 $P \in \mathbb{R}[X] / \deg(P) = p$

- $\deg(AP') =$  ;  $\deg(BP) =$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP)$

- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k, a_p \neq 0$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

*Application* : Soit  $A(X) = aX^n$ ,  $B(X) = bX^{n-1}$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^*$  et  
 $P \in \mathbb{R}[X] / \deg(P) = p$

- $\deg(AP') =$  ;  $\deg(BP) =$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP)$  ?

- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

*Application* : Soit  $A(X) = aX^n$ ,  $B(X) = bX^{n-1}$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^*$  et  
 $P \in \mathbb{R}[X] / \deg(P) = p$

- $\deg(AP') = n + p - 1$  ;  $\deg(BP) = n + p - 1$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP)$

- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

*Application* : Soit  $A(X) = aX^n, B(X) = bX^{n-1}$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^*$  et  
 $P \in \mathbb{R}[X] / \deg(P) = p$

- $\deg(AP') = n + p - 1$  ;  $\deg(BP) = n + p - 1$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP) \leq n + p - 1$

- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k, a_p \neq 0$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

*Application* : Soit  $A(X) = aX^n, B(X) = bX^{n-1}$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^*$  et  
 $P \in \mathbb{R}[X] / \deg(P) = p$

- $\deg(AP') = n + p - 1$  ;  $\deg(BP) = n + p - 1$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP) \leq n + p - 1$

- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k, a_p \neq 0$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

*Application* : Soit  $A(X) = aX^n$ ,  $B(X) = bX^{n-1}$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^*$  et  
 $P \in \mathbb{R}[X] / \deg(P) = p$

- $\deg(AP') = n + p - 1$  ;  $\deg(BP) = n + p - 1$   
Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP) \leq n + p - 1$

- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ ,  $a_p \neq 0$

D'où  $AP' + BP = (apa_p + ba_p)X^{n+p-1} + R(X)$  où  
 $\deg(R) \leq n + p - 2$

## degré d'une somme, d'un produit

**Rappel** :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X], \deg(P \cdot Q) = \deg(P) + \deg(Q)$  ;  
 $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$  ;

*Application* : Soit  $A(X) = aX^n, B(X) = bX^{n-1}$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}^*$  et  
 $P \in \mathbb{R}[X] / \deg(P) = p$

- $\deg(AP') = n + p - 1$  ;  $\deg(BP) = n + p - 1$   
 Que peut-on dire de  $\deg(AP' + BP) \leq n + p - 1$

- Précisons : On pose  $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k, a_p \neq 0$

D'où  $AP' + BP = (apa_p + ba_p)X^{n+p-1} + R(X)$  où  
 $\deg(R) \leq n + p - 2$

**conclusion** :  $\deg(AP' + BP) = \begin{cases} n + p - 1 & \text{si } ap + b \neq 0 \\ n + p - 2 & \text{si } ap + b = 0 \end{cases}$

# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) =$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en  $0$  : ;
- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :



# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en 0 : ;
- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en 0 : ;
- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en 0 :  $a_k = P^{(k)}(0)/k!$  ;
- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en 0 :  $a_k = P^{(k)}(0)/k!$  ;
- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en 0 :  $a_k = P^{(k)}(0)/k!$  ;

- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

$$X^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} (X-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (X-1)^k.$$

# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en

fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en  $0$  :  $a_k = P^{(k)}(0)/k!$  ;

- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

$$X^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} (X-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (X-1)^k. \text{ Ne}$$

pouvait-on pas retrouver autrement ce résultat ?

# Formule de Taylor

Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en

fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en  $0$  :  $a_k = P^{(k)}(0)/k!$  ;

- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

$$X^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} (X-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (X-1)^k. \text{ Ne}$$

pouvait-on pas retrouver autrement ce résultat ?

**Oui...**

# Formule de Taylor

## Rappel :

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n$ . Alors pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ . Exprimer pour tout  $0 \leq k \leq n$ ,  $a_k$  en

fonction de la dérivée  $k$ -ième de  $P$  en  $0$  :  $a_k = P^{(k)}(0)/k!$  ;

- Soit  $P(X) = X^n$ . Exprimer la formule de Taylor pour  $\alpha = 1$  :

$$X^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} (X-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (X-1)^k. \text{ Ne}$$

pouvait-on pas retrouver autrement ce résultat ?

**Oui...**  $X^n = (X-1+1)^n$



## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = \quad$  ;  $\alpha \cdot \beta = \quad$
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = \quad$  ;  $\alpha_1 \alpha_2 = \quad$
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  
 $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \quad$  ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \quad$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = \quad$
- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = \quad ; \prod_{i=1}^n \alpha_i = \quad$$

# Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?

**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$

- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$  ;  $\alpha \cdot \beta = c$
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{a_1}{a_2}$  ;  $\alpha_1 \alpha_2 = \frac{a_0}{a_2}$
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  
 $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -\frac{a_2}{a_3}$  ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \frac{a_1}{a_3}$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -\frac{a_0}{a_3}$
- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad ; \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i = \frac{(-1)^n a_0}{a_n}$$

## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = \quad$  ;  $\alpha \cdot \beta = \quad$
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = \quad$  ;  $\alpha_1 \alpha_2 = \quad$
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \quad$  ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \quad$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = \quad$
- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = \quad ; \prod_{i=1}^n \alpha_i = \quad$$

## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$ ;  $\alpha \cdot \beta = c$ .
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{a_1}{a_2}$  ;  $\alpha_1 \alpha_2 = \frac{a_0}{a_2}$
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -\frac{a_2}{a_3}$  ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \frac{a_1}{a_3}$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -\frac{a_0}{a_3}$
- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad ; \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i = \frac{(-1)^n a_0}{a_n}$$

## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$ ;  $\alpha \cdot \beta = c$ .
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = \quad$  ;  $\alpha_1 \alpha_2 = \quad$
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \quad$  ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \quad$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = \quad$
- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = \quad ; \prod_{i=1}^n \alpha_i = \quad$$

## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$ ;  $\alpha \cdot \beta = c$ .
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = -a_1/a_2$ ;  $\alpha_1 \alpha_2 = a_0/a_2$ .
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \dots$  ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \dots$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = \dots$
- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

Alors :  $\sum_{i=1}^n \alpha_i = \dots$  ;  $\prod_{i=1}^n \alpha_i = \dots$

## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$ ;  $\alpha \cdot \beta = c$ .
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = -a_1/a_2$ ;  $\alpha_1 \alpha_2 = a_0/a_2$ .
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 =$  ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 =$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 =$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = \quad ; \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i =$$

## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$ ;  $\alpha \cdot \beta = c$ .
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = -a_1/a_2$ ;  $\alpha_1 \alpha_2 = a_0/a_2$ .
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a_2/a_3$ ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = a_1/a_3$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -a_0/a_3$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = \quad ; \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i =$$



## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$ ;  $\alpha \cdot \beta = c$ .
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = -a_1/a_2$ ;  $\alpha_1 \alpha_2 = a_0/a_2$ .
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a_2/a_3$ ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = a_1/a_3$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -a_0/a_3$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = \quad ; \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i =$$

## Racines d'un polynôme

- Soit  $P(\alpha) = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , a-t-on toujours  $P(\bar{\alpha}) = 0$ ?  
**Non**, sauf si  $P \in \mathbb{R}[X]$
- Soit  $P(X) = X^2 + bX + c$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha$  et  $\beta$ . Alors :  
 $\alpha + \beta = -b$ ;  $\alpha \cdot \beta = c$ .
- Soit  $P(X) = a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ .  
 Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 = -a_1/a_2$ ;  $\alpha_1 \alpha_2 = a_0/a_2$ .
- Soit  $P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  et  $\alpha_3$ . Alors :  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a_2/a_3$ ;  
 $\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = a_1/a_3$  et  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = -a_0/a_3$

- Soit  $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  de racines dans  $\mathbb{C}$ ,  $\alpha_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\text{Alors : } \sum_{i=1}^n \alpha_i = -a_{n-1}/a_n; \quad \prod_{i=1}^n \alpha_i = (-1)^n P(0)/a_n$$

# Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$
- $P_2(X) = X^2 + 4$
  
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$
  
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$

## Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$ ;  $P_1 = (X - 1)(X + 1)$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_2(X) = X^2 + 4$
  
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$
  
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$

## Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$ ;  $P_1 = (X - 1)(X + 1)$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_2(X) = X^2 + 4$ ;  $P_2 = (X - 2i)(X + 2i)$  dans  $\mathbb{C}$  et  
 $P_2(X) = X^2 + 4$  dans  $\mathbb{R}$
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$
  
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$

## Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$ ;  $P_1 = (X - 1)(X + 1)$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_2(X) = X^2 + 4$ ;  $P_2 = (X - 2i)(X + 2i)$  dans  $\mathbb{C}$  et  
 $P_2(X) = X^2 + 4$  dans  $\mathbb{R}$
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$ ;  $P_3 = 2(X - 1)^2$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$
  
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$

## Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$ ;  $P_1 = (X - 1)(X + 1)$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_2(X) = X^2 + 4$ ;  $P_2 = (X - 2i)(X + 2i)$  dans  $\mathbb{C}$  et  
 $P_2(X) = X^2 + 4$  dans  $\mathbb{R}$
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$ ;  $P_3 = 2(X - 1)^2$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$ ;  $P_4 = 2(X - 1)(X - \frac{1}{2})$  dans  $\mathbb{R}$  et  
dans  $\mathbb{C}$
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$

## Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$ ;  $P_1 = (X - 1)(X + 1)$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_2(X) = X^2 + 4$ ;  $P_2 = (X - 2i)(X + 2i)$  dans  $\mathbb{C}$  et  
 $P_2(X) = X^2 + 4$  dans  $\mathbb{R}$
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$ ;  $P_3 = 2(X - 1)^2$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$ ;  $P_4 = 2(X - 1)(X - \frac{1}{2})$  dans  $\mathbb{R}$  et  
dans  $\mathbb{C}$
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$   
 $(X - 1)(X + 1)(X - e^{i\frac{\pi}{3}})(X - e^{-i\frac{\pi}{3}})(X - e^{2i\frac{\pi}{3}})(X - e^{-2i\frac{\pi}{3}})$



## Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$ ;  $P_1 = (X - 1)(X + 1)$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_2(X) = X^2 + 4$ ;  $P_2 = (X - 2i)(X + 2i)$  dans  $\mathbb{C}$  et  
 $P_2(X) = X^2 + 4$  dans  $\mathbb{R}$
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$ ;  $P_3 = 2(X - 1)^2$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$ ;  $P_4 = 2(X - 1)(X - \frac{1}{2})$  dans  $\mathbb{R}$  et  
dans  $\mathbb{C}$
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$   
 $(X - 1)(X + 1)(X - e^{i\frac{\pi}{3}})(X - e^{-i\frac{\pi}{3}})(X - e^{2i\frac{\pi}{3}})(X - e^{-2i\frac{\pi}{3}})$   
Soit  $P_5(X) =$

## Décomposition d'un polynôme

Factoriser les polynômes suivants dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$

- $P_1(X) = X^2 - 1$ ;  $P_1 = (X - 1)(X + 1)$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_2(X) = X^2 + 4$ ;  $P_2 = (X - 2i)(X + 2i)$  dans  $\mathbb{C}$  et  
 $P_2(X) = X^2 + 4$  dans  $\mathbb{R}$
- $P_3(X) = 2X^2 - 4X + 2$ ;  $P_3 = 2(X - 1)^2$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_4(X) = 2X^2 - 3X + 1$ ;  $P_4 = 2(X - 1)(X - \frac{1}{2})$  dans  $\mathbb{R}$  et dans  $\mathbb{C}$
- $P_5(X) = X^6 - 1 =$   
 $(X - 1)(X + 1)(X - e^{i\frac{\pi}{3}})(X - e^{-i\frac{\pi}{3}})(X - e^{2i\frac{\pi}{3}})(X - e^{-2i\frac{\pi}{3}})$   
 Soit  $P_5(X) = (X - 1)(X + 1)(X^2 - X + 1)(X^2 + X + 1)$

## racines multiples

**Rappel** :  $P \in \mathbb{K}[X]$ .  $P$  admet  $a$  pour racine multiple d'ordre  $r$  si :  
 $\exists Q \in \mathbb{K}[X]/P(X) = (X - a)^r Q(X)$ , avec  $Q(a) \neq 0$   
 $P(a) = 0 = P'(a) = \dots = P^{(r-1)}(a)$  et  $P^{(r)}(a) \neq 0$

*Application* : Soit  $P(X) = (X + 1)^7 - X^7 - 1$ .

- Montrer que  $j$  est racine double de  $P$  :

Conséquence ?

- Donner deux racines évidentes de  $P$  : . Quel est leur ordre de multiplicité ?
- Factoriser  $P$  dans  $\mathbb{C}$  et dans  $\mathbb{R}$  :  
Dans  $\mathbb{C}$ ,  
Dans  $\mathbb{R}$ ,



## racines multiples

**Rappel** :  $P \in \mathbb{K}[X]$ .  $P$  admet  $a$  pour racine multiple d'ordre  $r$  si :  
 $\exists Q \in \mathbb{K}[X]/P(X) = (X - a)^r Q(X)$ , avec  $Q(a) \neq 0$   
 $P(a) = 0 = P'(a) = \dots = P^{(r-1)}(a)$  et  $P^{(r)}(a) \neq 0$

*Application* : Soit  $P(X) = (X + 1)^7 - X^7 - 1$ .

- Montrer que  $j$  est racine double de  $P$  : On note que  
 $P'(X) = 7[(X + 1)^6 - X^6]$ . D'où  $P(j) = P'(j) = 0$  C.Q.F.D.  
 Conséquence ?  $P \in \mathbb{R}[X]$  donc  $j^2 = \bar{j}$  est racine double de  $P$ .
- Donner deux racines évidentes de  $P$  :                      . Quel est leur ordre de multiplicité ?
- Factoriser  $P$  dans  $\mathbb{C}$  et dans  $\mathbb{R}$  :  
 Dans  $\mathbb{C}$ ,  
 Dans  $\mathbb{R}$ ,

## racines multiples

**Rappel** :  $P \in \mathbb{K}[X]$ .  $P$  admet  $a$  pour racine multiple d'ordre  $r$  si :  
 $\exists Q \in \mathbb{K}[X]/P(X) = (X - a)^r Q(X)$ , avec  $Q(a) \neq 0$   
 $P(a) = 0 = P'(a) = \dots = P^{(r-1)}(a)$  et  $P^{(r)}(a) \neq 0$

*Application* : Soit  $P(X) = (X + 1)^7 - X^7 - 1$ .

- Montrer que  $j$  est racine double de  $P$  : On note que  
 $P'(X) = 7[(X + 1)^6 - X^6]$ . D'où  $P(j) = P'(j) = 0$  C.Q.F.D.  
 Conséquence ?  $P \in \mathbb{R}[X]$  donc  $j^2 = \bar{j}$  est racine double de  $P$ .
- Donner deux racines évidentes de  $P$  : 0 et  $-1$ . Quel est leur ordre de multiplicité ?
- Factoriser  $P$  dans  $\mathbb{C}$  et dans  $\mathbb{R}$  :  
 Dans  $\mathbb{C}$ ,  
 Dans  $\mathbb{R}$ ,

## racines multiples

**Rappel** :  $P \in \mathbb{K}[X]$ .  $P$  admet  $a$  pour racine multiple d'ordre  $r$  si :  
 $\exists Q \in \mathbb{K}[X]/P(X) = (X - a)^r Q(X)$ , avec  $Q(a) \neq 0$   
 $P(a) = 0 = P'(a) = \dots = P^{(r-1)}(a)$  et  $P^{(r)}(a) \neq 0$

*Application* : Soit  $P(X) = (X + 1)^7 - X^7 - 1$ .

- Montrer que  $j$  est racine double de  $P$  : On note que  
 $P'(X) = 7[(X + 1)^6 - X^6]$ . D'où  $P(j) = P'(j) = 0$  C.Q.F.D.  
 Conséquence ?  $P \in \mathbb{R}[X]$  donc  $j^2 = \bar{j}$  est racine double de  $P$ .
- Donner deux racines évidentes de  $P$  : 0 et  $-1$ . Quel est leur ordre de multiplicité ?  $P$  admet 6 racines dans  $\mathbb{C}$ , comptées avec leur ordre de multiplicité. Donc **racines simples**.
- Factoriser  $P$  dans  $\mathbb{C}$  et dans  $\mathbb{R}$  :  
 Dans  $\mathbb{C}$ ,  
 Dans  $\mathbb{R}$ ,

## racines multiples

**Rappel** :  $P \in \mathbb{K}[X]$ .  $P$  admet  $a$  pour racine multiple d'ordre  $r$  si :  
 $\exists Q \in \mathbb{K}[X]/P(X) = (X - a)^r Q(X)$ , avec  $Q(a) \neq 0$   
 $P(a) = 0 = P'(a) = \dots = P^{(r-1)}(a)$  et  $P^{(r)}(a) \neq 0$

*Application* : Soit  $P(X) = (X + 1)^7 - X^7 - 1$ .

- Montrer que  $j$  est racine double de  $P$  : On note que  
 $P'(X) = 7[(X + 1)^6 - X^6]$ . D'où  $P(j) = P'(j) = 0$  C.Q.F.D.  
 Conséquence ?  $P \in \mathbb{R}[X]$  donc  $j^2 = \bar{j}$  est racine double de  $P$ .
- Donner deux racines évidentes de  $P$  : 0 et  $-1$ . Quel est leur ordre de multiplicité ?  $P$  admet 6 racines dans  $\mathbb{C}$ , comptées avec leur ordre de multiplicité. Donc **racines simples**.
- Factoriser  $P$  dans  $\mathbb{C}$  et dans  $\mathbb{R}$  :  
 Dans  $\mathbb{C}$ ,  $P(X) = 7X(X + 1)(X - j)^2(X - \bar{j})^2$   
 Dans  $\mathbb{R}$ ,



## racines multiples

**Rappel** :  $P \in \mathbb{K}[X]$ .  $P$  admet  $a$  pour racine multiple d'ordre  $r$  si :  
 $\exists Q \in \mathbb{K}[X]/P(X) = (X - a)^r Q(X)$ , avec  $Q(a) \neq 0$   
 $P(a) = 0 = P'(a) = \dots = P^{(r-1)}(a)$  et  $P^{(r)}(a) \neq 0$

*Application* : Soit  $P(X) = (X + 1)^7 - X^7 - 1$ .

- Montrer que  $j$  est racine double de  $P$  : On note que  
 $P'(X) = 7[(X + 1)^6 - X^6]$ . D'où  $P(j) = P'(j) = 0$  C.Q.F.D.  
 Conséquence ?  $P \in \mathbb{R}[X]$  donc  $j^2 = \bar{j}$  est racine double de  $P$ .
- Donner deux racines évidentes de  $P$  : 0 et  $-1$ . Quel est leur ordre de multiplicité ?  $P$  admet 6 racines dans  $\mathbb{C}$ , comptées avec leur ordre de multiplicité. Donc **racines simples**.
- Factoriser  $P$  dans  $\mathbb{C}$  et dans  $\mathbb{R}$  :  
 Dans  $\mathbb{C}$ ,  $P(X) = 7X(X + 1)(X - j)^2(X - \bar{j})^2$   
 Dans  $\mathbb{R}$ ,  $P(X) = 7X(X + 1)(X^2 + X + 1)^2$

# Montrer que $Q$ divise $P$

Méthode :

Montrer que **les** racines de  $Q$  sont **des** racines de  $P$

*Application :*

- Comment montre-t-on que  $P \in \mathbb{R}[X]$  est divisible par  $Q(X) = X^2 - (a + b)X + ab$  ?

## Montrer que $Q$ divise $P$

### Méthode :

Montrer que **les** racines de  $Q$  sont **des** racines de  $P$

### Application :

- Comment montre-t-on que  $P \in \mathbb{R}[X]$  est divisible par  $Q(X) = X^2 - (a + b)X + ab$  ?

Les racines de  $Q$  sont  $x_1 = a$  et  $x_2 = b$ . Il suffit donc pour conclure de montrer que  $P(a) = 0 = P(b)$